

Tab. 12: Kategorien der Roten Listen (Übersichtstabelle aller Arten siehe S. 924 ff.).

| Kürzel   | Einstufung                             | Definition   |
|----------|--|--|
| <b>0</b> | <b>Ausgestorben oder verschollen</b>   | Arten, die in Baden-Württemberg verschwunden sind oder von denen keine wild lebenden Populationen mehr bekannt sind. Die Populationen sind entweder (a) nachweisbar ausgestorben, in aller Regel ausgerottet (die bisherigen Habitate oder Standorte sind so stark verändert, dass mit einem Wiederfund nicht mehr zu rechnen ist) oder (b) verschollen, das heißt, aufgrund vergeblicher Nachsuche über einen längeren Zeitraum besteht der begründete Verdacht, dass ihre Populationen erloschen sind. |
| <b>1</b> | <b>Vom Aussterben bedroht</b>          | Arten, die so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in absehbarer Zeit aussterben, wenn die Gefährdungsursachen fortbestehen. Ein Überleben im Bezugsraum kann nur durch sofortige Beseitigung der Ursachen oder wirksame Schutz- und Hilfsmaßnahmen für die Restbestände dieser Arten gesichert werden.  |
| <b>2</b> | <b>Stark gefährdet</b>                 | Arten, die erheblich zurückgegangen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche Einwirkungen erheblich bedroht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abgewendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ auf.  |
| <b>3</b> | <b>Gefährdet</b>                       | Arten, die merklich zurückgegangen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche Einwirkungen bedroht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abgewendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „Stark gefährdet“ auf.  |
| <b>G</b> | <b>Gefährdung unbekanntes Ausmaßes</b> | Arten, die gefährdet sind. Einzelne Untersuchungen lassen eine Gefährdung erkennen, aber die vorliegenden Informationen reichen für eine exakte Zuordnung zu den Kategorien 1 bis 3 nicht aus.   |
| <b>R</b> | <b>Extrem selten</b>                   | Extrem seltene bzw. sehr lokal vorkommende Arten, deren Bestände <i>in der Summe</i> weder lang- noch kurzfristig abgenommen haben und die auch nicht aktuell bedroht, aber gegenüber unvorhersehbaren Gefährdungen besonders anfällig sind.   |
| <b>V</b> | <b>Vorwarnliste</b>                    | Arten, die merklich zurückgegangen sind, aber aktuell noch nicht gefährdet sind. Bei Fortbestehen von bestandsreduzierenden Einwirkungen ist in naher Zukunft eine Einstufung in die Kategorie „Gefährdet“ wahrscheinlich.   |
| <b>D</b> | <b>Datenlage unzureichend</b>          | Die Informationen zu Verbreitung, Biologie und Gefährdung einer Art sind unzureichend, wenn sie (a) bisher oft übersehen bzw. nicht unterschieden wurde oder (b) erst in jüngster Zeit taxonomisch untersucht wurde oder (c) taxonomisch nicht ausreichend geklärt ist oder (d) mangels Spezialisten eine mögliche Gefährdung nicht beurteilt werden kann.   |
| <b>*</b> | <b>Ungefährdet</b>                     | Arten werden als derzeit nicht gefährdet angesehen, wenn ihre Bestände zugenommen haben, stabil sind oder so wenig zurückgegangen sind, dass sie nicht mindestens in die Kategorie V eingestuft werden müssen.   |
| <b>◆</b> | <b>Nicht bewertet</b>                  | Für diese Arten wird keine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Darunter fallen zum Beispiel Arten, die nur kurzfristig eingeschleppt wurden, oder Arten mit unsicheren Vorkommen.   |

## Rote Liste und Artenverzeichnis der Rüsselkäfer Baden-Württembergs

Im folgenden wird eine zusammenfassende tabellarische Darstellung der Einstufungen für die in Baden-Württemberg nachgewiesenen Rüsselkäfer veröffentlicht. Die Einstufung erfolgte nach den standardisierten Kriterien von LUDWIG et al. (2006). Zur genauen Definition der Gefährdungsgrade siehe S. 160. Wie auf S. 157–159 genauer erläutert, ist aufgrund der recht spärlichen Datenlage bei vielen Arten nur eine vorläufige Einstufung möglich, und in einigen Fällen musste auf die Einstufungen G (gefährdet, Grad unklar) oder D (Datenlage unzureichend) zurückgegriffen werden. Für eine statistische Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse siehe S. 155–156. Die Gründe für die Einstufung werden im jeweiligen Artkapitel unter „Gefährdung“ genauer erläutert.

### Abkürzungen der Gefährdungsgrade

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen   |
| 1 | Vom Aussterben bedroht          |
| 2 | Stark gefährdet                 |
| 3 | Gefährdet                       |
| G | Gefährdung unbekanntes Ausmaßes |
| R | Extrem selten                   |
| V | Vorwarnliste                    |
| D | Datenlage unzureichend          |
| * | Ungefährdet                     |
| ◆ | Nicht bewertet                  |

### Sonstige Abkürzungen

|     |   |
|-----|---|
| [N] | Neozoon (nicht heimische Art)             |
| [u] | Unbeständig vorkommende Art (Adventivart) |

|  |   |
|--|---|
| <i>Acalles camelus</i> (FABRICIUS, 1792).....*             | <i>Anthonomus humeralis</i> (PANZER, 1795).....*      |
| <i>Acalles dubius</i> SOLARI, 1907.....*                   | <i>Anthonomus pedicularius</i> (LINNAEUS, 1758).....* |
| <i>Acalles echinatus</i> (GERMAR, 1824).....*              | <i>Anthonomus phyllocola</i> (HERBST, 1795).....*     |
| <i>Acalles fallax</i> BOHEMAN, 1844.....*                  | <i>Anthonomus pinivorax</i> SILFVERBERG, 1977.....G   |
| <i>Acalles lemur</i> (GERMAR, 1824).....*                  | <i>Anthonomus piri</i> KOLLAR, 1837.....D             |
| <i>Acalles micros</i> DIECKMANN, 1982.....*                | <i>Anthonomus pomorum</i> (LINNAEUS, 1758).....*      |
| <i>Acalles ptinoides</i> (MARSHAM, 1802).....G             | <i>Anthonomus rectirostris</i> (LINNAEUS, 1758).....* |
| <i>Acalyptus carpini</i> (FABRICIUS, 1792).....*           | <i>Anthonomus rubi</i> (HERBST, 1795).....*           |
| <i>Acalyptus sericeus</i> GYLLENHAL, 1835.....V            | <i>Anthonomus rufus</i> GYLLENHAL, 1836.....*         |
| <i>Acentrotypus brunnipes</i> (BOHEMAN, 1839).....0        | <i>Anthonomus spilotus</i> REDTENBACHER, 1849.....1   |
| <i>Adexius scrobipennis</i> GYLLENHAL, 1834.....*          | <i>Anthonomus ulmi</i> (DEGEER, 1775).....V           |
| <i>Aizobius sedi</i> (GERMAR, 1818).....*                  | <i>Anthonomus undulatus</i> GYLLENHAL, 1836.....D     |
| <i>Allandrus undulatus</i> (PANZER, 1795).....V            | <i>Anthribus fasciatus</i> FORSTER, 1770.....G        |
| <i>Alocentron curvirostre</i> (GYLLENHAL, 1833) [N].....◆  | <i>Anthribus nebulosus</i> FORSTER, 1770.....*        |
| <i>Amalorrhynchus melanarius</i> (STEPHENS, 1831).....*    | <i>Apion cruentatum</i> WALTON, 1844.....*            |
| <i>Amalus scortillum</i> (HERBST, 1795).....*              | <i>Apion frumentarium</i> (LINNAEUS, 1758).....*      |
| <i>Anoplus plantaris</i> (NAEZÉN, 1794).....*              | <i>Apion haematodes</i> W. KIRBY, 1808.....*          |
| <i>Anoplus roboris</i> SUFFRIAN, 1840.....*                | <i>Apion rubens</i> STEPHENS, 1839.....V              |
| <i>Anoplus setulosus</i> KIRSCH, 1870.....3                | <i>Apion rubiginosum</i> GRILL, 1893.....3            |
| <i>Anthonomus bituberculatus</i> C. G. THOMSON, 1868.....3 | <i>Apoderus coryli</i> (LINNAEUS, 1758).....*         |
| <i>Anthonomus chevrolati</i> DESBROCHERS, 1868.....D       | <i>Archarius crux</i> (FABRICIUS, 1776).....*         |
| <i>Anthonomus conspersus</i> DESBROCHERS, 1868.....*       | <i>Archarius pyrrhoceras</i> (MARSHAM, 1802).....*    |

|   |  |
|---|--|
| <i>Archarius salicivorus</i> (PAYKULL, 1792).....*    | <i>Bruchela rufipes</i> (OLIVIER, 1790).....*                  |
| <i>Aspidapion aeneum</i> (FABRICIUS, 1775).....*      | <i>Bruchela suturalis</i> (FABRICIUS, 1792).....*              |
| <i>Aspidapion radiolus</i> (MARSHAM, 1802).....*      | <i>Byctiscus betulae</i> (LINNAEUS, 1758).....*                |
| <i>Aspidapion validum</i> (GERMAR, 1817) [N].....◆    | <i>Byctiscus populi</i> (LINNAEUS, 1758).....*                 |
| <i>Attelabus nitens</i> (SCOPOLI, 1763).....*         | <i>Caenorhinus mannerheimii</i> (HUMMEL, 1823).....V           |
| <i>Auletobius sanguisorbae</i> (SCHRANK, 1798).....0  | <i>Calosirus apicalis</i> (GYLLENHAL, 1827).....0              |
| <i>Auleutes epilobii</i> (PAYKULL, 1800).....*        | <i>Calosirus terminatus</i> (HERBST, 1795).....G               |
| <i>Bagous alismatis</i> (MARSHAM, 1802).....2         | <i>Camptorhinus statua</i> (ROSSI, 1790).....1                 |
| <i>Bagous collignensis</i> (HERBST, 1797).....2       | <i>Catapion koestlini</i> (DIECKMANN, 1989).....D              |
| <i>Bagous diglyptus</i> BOHEMAN, 1845.....1           | <i>Catapion meieri</i> (DESBROCHERS, 1901).....*               |
| <i>Bagous frit</i> (HERBST, 1795).....2               | <i>Catapion pubescens</i> (W. KIRBY, 1811).....*               |
| <i>Bagous glabrirostris</i> (HERBST, 1795).....0      | <i>Catapion seniculus</i> (W. KIRBY, 1808).....*               |
| <i>Bagous limosus</i> (GYLLENHAL, 1827).....0         | <i>Cathormiocerus aristatus</i> (GYLLENHAL, 1827).....*        |
| <i>Bagous longitarsis</i> C. G. THOMSON, 1868.....G   | <i>Cathormiocerus spinosus</i> (GOEZE, 1777).....*             |
| <i>Bagous lutosus</i> (GYLLENHAL, 1813).....2         | <i>Ceratapion armatum</i> (GERSTAECKER, 1854).....0            |
| <i>Bagous lutulentus</i> GYLLENHAL, 1813.....3        | <i>Ceratapion basicorne</i> (ILLIGER, 1807).....2              |
| <i>Bagous lutulentus</i> (GYLLENHAL, 1827).....0      | <i>Ceratapion carduorum</i> (W. KIRBY, 1808).....D             |
| <i>Bagous subcarinatus</i> GYLLENHAL, 1836.....2      | <i>Ceratapion gibbirostre</i> (GYLLENHAL, 1813).....V          |
| <i>Bagous tempestivus</i> (HERBST, 1795).....*        | <i>Ceratapion onopordi</i> (W. KIRBY, 1808).....*              |
| <i>Bagous tubulus</i> CALDARA & O'BRIEN, 1994.....2   | <i>Ceratapion penetrans</i> (GERMAR, 1817).....V               |
| <i>Baris analis</i> (OLIVIER, 1790).....1             | <i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> GERMAR, 1824.....0            |
| <i>Baris artemisiae</i> (HERBST, 1795).....*          | <i>Ceutorhynchus alliariae</i> H. BRISOUT, 1860.....*          |
| <i>Baris chlorizans</i> (GERMAR, 1824).....2          | <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (PAYKULL, 1792).....*           |
| <i>Baris coerulescens</i> (SCOPOLI, 1763).....*       | <i>Ceutorhynchus atomus</i> BOHEMAN, 1845.....*                |
| <i>Baris cuprirostris</i> (FABRICIUS, 1787).....2     | <i>Ceutorhynchus barbareae</i> SUFFRIAN, 1847.....D            |
| <i>Baris fallax</i> (H. BRISOUT, 1870).....3          | <i>Ceutorhynchus carinatus</i> GYLLENHAL, 1837.....D           |
| <i>Baris laticollis</i> (MARSHAM, 1802).....*         | <i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> GERMAR, 1824.....*             |
| <i>Baris lepidii</i> GERMAR, 1824.....*               | <i>Ceutorhynchus cochleariae</i> (GYLLENHAL, 1813).....*       |
| <i>Baris morio</i> (BOHEMAN, 1844).....0              | <i>Ceutorhynchus coerulescens</i> GYLLENHAL, 1837.....2        |
| <i>Baris picicornis</i> (MARSHAM, 1802).....*         | <i>Ceutorhynchus constrictus</i> (MARSHAM, 1802).....*         |
| <i>Baris scolopacea</i> GERMAR, 1824 [u].....◆        | <i>Ceutorhynchus contractus</i> (MARSHAM, 1802).....*          |
| <i>Barynotus alternans</i> BOHEMAN, 1834.....G        | <i>Ceutorhynchus erysimi</i> (FABRICIUS, 1787).....*           |
| <i>Barynotus moerens</i> (FABRICIUS, 1792).....*      | <i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> SOLARI, 1949.....D          |
| <i>Barynotus obscurus</i> (FABRICIUS, 1775).....*     | <i>Ceutorhynchus granulicollis</i> (C. G. THOMSON, 1865).....3 |
| <i>Barypeithes araneiformis</i> (SCHRANK, 1781).....* | <i>Ceutorhynchus griseus</i> C. BRISOUT, 1869.....3            |
| <i>Barypeithes maritimus</i> FORMANEK, 1904.....V     | <i>Ceutorhynchus hampei</i> C. BRISOUT, 1869.....*             |
| <i>Barypeithes mollicomus</i> (AHRENS, 1812).....*    | <i>Ceutorhynchus hirtulus</i> GERMAR, 1824.....V               |
| <i>Barypeithes montanus</i> (CHEVROLAT, 1863).....*   | <i>Ceutorhynchus ignitus</i> GERMAR, 1824.....*                |
| <i>Barypeithes pellucidus</i> (BOHEMAN, 1834).....*   | <i>Ceutorhynchus inaeffectatus</i> GYLLENHAL, 1837.....3       |
| <i>Barypeithes trichopterus</i> (GAUTIER, 1863).....V | <i>Ceutorhynchus interjectus</i> SCHULTZE, 1903.....2          |
| <i>Betulapion simile</i> (W. KIRBY, 1811).....*       | <i>Ceutorhynchus leprieuri</i> C. BRISOUT, 1881.....0          |
| <i>Bothynoderes affinis</i> (SCHRANK, 1781).....2     | <i>Ceutorhynchus nanus</i> GYLLENHAL, 1837.....2               |
| <i>Brachonyx pineti</i> (PAYKULL, 1792).....*         | <i>Ceutorhynchus napi</i> GYLLENHAL, 1837.....*                |
| <i>Brachyderes incanus</i> (LINNAEUS, 1758).....*     | <i>Ceutorhynchus obstructus</i> (MARSHAM, 1802).....*          |
| <i>Brachypera dauci</i> (OLIVIER, 1807).....3         | <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (MARSHAM, 1802).....*       |
| <i>Brachypera zoilus</i> (SCOPOLI, 1763).....*        | <i>Ceutorhynchus pandellei</i> C. BRISOUT, 1869.....3          |
| <i>Brachysomus echinatus</i> (BONSDORFF, 1785).....*  | <i>Ceutorhynchus parvulus</i> C. BRISOUT, 1869.....V           |
| <i>Brachysomus hirtus</i> (BOHEMAN, 1845).....*       | <i>Ceutorhynchus pectoralis</i> WEISE, 1895.....*              |
| <i>Brachytemnus porcatus</i> (GERMAR, 1824).....V     | <i>Ceutorhynchus pervicax</i> WEISE, 1883.....*                |
| <i>Bradybatus fallax</i> GERSTAECKER, 1860.....*      | <i>Ceutorhynchus picitarsis</i> GYLLENHAL, 1837.....*          |
| <i>Bradybatus kellneri</i> BACH, 1854.....*           | <i>Ceutorhynchus posthumus</i> GERMAR, 1824.....1              |
| <i>Bruchela conformis</i> (SUFFRIAN, 1845).....V      | <i>Ceutorhynchus pumilio</i> (GYLLENHAL, 1827).....3           |

|  |   |
|--|---|
| <i>Ceutorhynchus puncticollis</i> BOHEMAN, 1845.....*      | <i>Coniocleonus hollbergii</i> (FAHRAEUS, 1842).....3   |
| <i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> (MARSHAM, 1802).D      | <i>Coniocleonus nebulosus</i> (LINNAEUS, 1758).....0    |
| <i>Ceutorhynchus querceti</i> GYLLENHAL, 1813.....0        | <i>Coniocleonus nigrosuturatus</i> (GOEZE, 1777).....G  |
| <i>Ceutorhynchus rapae</i> GYLLENHAL, 1837.....V           | <i>Conotrachelus naso</i> LECONTE, 1876 [u].....◆       |
| <i>Ceutorhynchus resedae</i> (MARSHAM, 1802).....3         | <i>Coryssomerus capucinus</i> (BECK, 1817).....*        |
| <i>Ceutorhynchus rhenanus</i> (SCHULTZE, 1895).....G       | <i>Cossonus cylindricus</i> SAHLBERG, 1835.....*        |
| <i>Ceutorhynchus roberti</i> GYLLENHAL, 1837.....*         | <i>Cossonus linearis</i> (FABRICIUS, 1775).....*        |
| <i>Ceutorhynchus rusticus</i> GYLLENHAL, 1837.....3        | <i>Cossonus parallelepipedus</i> (HERBST, 1795).....*   |
| <i>Ceutorhynchus scapularis</i> GYLLENHAL, 1837.....V      | <i>Cotaster cuneipennis</i> (AUBÉ, 1850).....G          |
| <i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>                          | <i>Cotaster uncipes</i> (BOHEMAN, 1838).....G           |
| NERESHEIMER & WAGNER, 1924.....*                           | <i>Cryptorhynchus lapathi</i> (LINNAEUS, 1758).....*    |
| <i>Ceutorhynchus similis</i> C. BRISOUT, 1869.....2        | <i>Curculio betulae</i> (STEPHENS, 1831).....3          |
| <i>Ceutorhynchus striatellus</i> SCHULTZE, 1900.....2      | <i>Curculio elephas</i> (GYLLENHAL, 1836) [u].....◆     |
| <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (PAYKULL, 1800).....*     | <i>Curculio glandium</i> MARSHAM, 1802.....*            |
| <i>Ceutorhynchus syrites</i> GERMAR, 1824.....0            | <i>Curculio nucum</i> LINNAEUS, 1758.....*              |
| <i>Ceutorhynchus turbatus</i> SCHULTZE, 1903.....*         | <i>Curculio pellitus</i> (BOHEMAN, 1843).....V          |
| <i>Ceutorhynchus typhae</i> (HERBST, 1795).....*           | <i>Curculio rubidus</i> (GYLLENHAL, 1836).....V         |
| <i>Ceutorhynchus unguicularis</i> C. G. THOMSON, 1871.3    | <i>Curculio venosus</i> (GRAVENHORST, 1807).....*       |
| <i>Chlorophanus gibbosus</i> (PAYKULL, 1792).....0         | <i>Curculio villosus</i> FABRICIUS, 1781.....*          |
| <i>Chlorophanus graminicola</i> SCHÖNHERR, 1832.....0      | <i>Cyanapion afer</i> (GYLLENHAL, 1833).....*           |
| <i>Chlorophanus viridis</i> (LINNAEUS, 1758).....V         | <i>Cyanapion columbinum</i> (GERMAR, 1817).....*        |
| <i>Chonostropheus seminiger</i> (REITTER, 1880).....2      | <i>Cyanapion gyllenhalii</i> (W. KIRBY, 1808).....V     |
| <i>Chonostropheus tristis</i> (FABRICIUS, 1794).....V      | <i>Cyanapion platalea</i> (GERMAR, 1817).....*          |
| <i>Choragus horni</i> WOLFRUM, 1930.....G                  | <i>Cyanapion spencii</i> (W. KIRBY, 1808).....*         |
| <i>Choragus sheppardi</i> W. KIRBY, 1819.....G             | <i>Cyphocleonus dealbatus</i> (GMELIN, 1790).....G      |
| <i>Cimberis attelaboides</i> (FABRICIUS, 1787).....*       | <i>Cyphocleonus trisulcatus</i> (HERBST, 1795).....3    |
| <i>Cionus alauda</i> (HERBST, 1784).....*                  | <i>Datonychus angulosus</i> (BOHEMAN, 1845).....V       |
| <i>Cionus hortulanus</i> (GEOFFROY, 1785).....*            | <i>Datonychus arquatus</i> (HERBST, 1795).....3         |
| <i>Cionus leonhardi</i> WINGELMÜLLER, 1914.....2           | <i>Datonychus derennei</i> (GUILLEBEAU, 1936).....2     |
| <i>Cionus longicollis</i> C. BRISOUT, 1863.....V           | <i>Datonychus melanostictus</i> (MARSHAM, 1802).....*   |
| <i>Cionus nigratarsis</i> REITTER, 1904.....V              | <i>Datonychus urticae</i> (BOHEMAN, 1845).....2         |
| <i>Cionus olens</i> FABRICIUS, 1792.....*                  | <i>Deporaus betulae</i> (LINNAEUS, 1758).....*          |
| <i>Cionus olivieri</i> ROSENSCHÖLD, 1838.....0             | <i>Diplapion confluens</i> (W. KIRBY, 1808).....3       |
| <i>Cionus scrophulariae</i> (LINNAEUS, 1758).....V         | <i>Diplapion stolidum</i> (GERMAR, 1817).....*          |
| <i>Cionus thapsus</i> (FABRICIUS, 1792).....V              | <i>Dissoleucas niveirostris</i> (FABRICIUS, 1798).....* |
| <i>Cionus tuberculatus</i> (SCOPOLI, 1763).....*           | <i>Donus comatus</i> (BOHEMAN, 1842).....*              |
| <i>Cleonis pigra</i> (SCOPOLI, 1763).....*                 | <i>Donus intermedius</i> (BOHEMAN, 1842).....G          |
| <i>Cleopomiarus distinctus</i> (BOHEMAN, 1845).....G       | <i>Donus ovalis</i> (BOHEMAN, 1842).....*               |
| <i>Cleopomiarus graminis</i> (GYLLENHAL, 1813).....*       | <i>Donus palumbarius</i> (GERMAR, 1821).....0           |
| <i>Cleopomiarus micros</i> (GERMAR, 1821).....G            | <i>Donus tessellatus</i> (BOHEMAN, 1834).....0          |
| <i>Cleopus pulchellus</i> (HERBST, 1795).....V             | <i>Dorytomus dejeani</i> FAUST, 1882.....*              |
| <i>Cleopus solani</i> (FABRICIUS, 1792).....*              | <i>Dorytomus dorsalis</i> (LINNAEUS, 1758).....3        |
| <i>Coccygorhynchites sericeus</i> (HERBST, 1797).....*     | <i>Dorytomus edoughensis</i> DESBROCHERS, 1875.....*    |
| <i>Coeliastes lamii</i> (FABRICIUS, 1792).....*            | <i>Dorytomus filirostris</i> (GYLLENHAL, 1836).....*    |
| <i>Coeliodes rana</i> (FABRICIUS, 1787).....*              | <i>Dorytomus hirtipennis</i> BEDEL, 1884.....*          |
| <i>Coeliodes ruber</i> (MARSHAM, 1802).....*               | <i>Dorytomus ictor</i> (HERBST, 1795).....*             |
| <i>Coeliodes transversealbofasciatus</i> (GOEZE, 1777)...* | <i>Dorytomus longimanus</i> (FORSTER, 1771).....*       |
| <i>Coeliodes trifasciatus</i> BACH, 1854.....V             | <i>Dorytomus majalis</i> (PAYKULL, 1792).....3          |
| <i>Coeliodinus nigratarsis</i> (HARTMANN, 1895).....G      | <i>Dorytomus melanophthalmus</i> (PAYKULL, 1792).....*  |
| <i>Coeliodinus rubicundus</i> (HERBST, 1795).....*         | <i>Dorytomus minutus</i> (GYLLENHAL, 1836).....V        |
| <i>Coniatus wenckeri</i> CAPIOMONT, 1868.....0             | <i>Dorytomus nebulosus</i> (GYLLENHAL, 1836).....*      |
| <i>Coniocleonus cicatricosus</i> (HOPPE, 1795).....0       | <i>Dorytomus occallescens</i> (GYLLENHAL, 1836).....3   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Dorytomus puberulus</i> (BOHEMAN, 1843).....*             | <i>Hadroplontus trimaculatus</i> (FABRICIUS, 1775).....3   |
| <i>Dorytomus rufatus</i> (BEDEL, 1888).....*                 | <i>Helianthemapion aciculare</i> (GERMAR, 1817).....V      |
| <i>Dorytomus salicinus</i> (GYLLENHAL, 1827).....G           | <i>Hemitrichapion lanigerum</i> (GEMMINGER, 1871).....3    |
| <i>Dorytomus salicis</i> WALTON, 1851.....G                  | <i>Hemitrichapion pavidum</i> (GERMAR, 1817).....*         |
| <i>Dorytomus schoenherrii</i> FAUST, 1882.....3              | <i>Hemitrichapion reflexum</i> (GYLLENHAL, 1833).....V     |
| <i>Dorytomus suratus</i> (GYLLENHAL, 1836).....V             | <i>Hemitrichapion waltoni</i> (STEPHENS, 1839).....V       |
| <i>Dorytomus taeniatus</i> (FABRICIUS, 1781).....*           | <i>Hexarthrum exiguum</i> (BOHEMAN, 1838) [u].....◆        |
| <i>Dorytomus tortrix</i> (LINNAEUS, 1761).....*              | <i>Holotrichapion aethiops</i> (HERBST, 1797).....*        |
| <i>Dorytomus tremulae</i> (PAYKULL, 1787).....*              | <i>Holotrichapion gracilicolle</i> (GYLLENHAL, 1839).....0 |
| <i>Dorytomus villosulus</i> (GYLLENHAL, 1836).....V          | <i>Holotrichapion ononis</i> (W. KIRBY, 1808).....*        |
| <i>Doydirhynchus austriacus</i> (OLIVIER, 1807).....*        | <i>Holotrichapion pisi</i> (FABRICIUS, 1801).....*         |
| <i>Drupenatus nasturtii</i> (GERMAR, 1824).....*             | <i>Hylobius abietis</i> (LINNAEUS, 1758).....*             |
| <i>Dryophthorus corticalis</i> (PAYKULL, 1792).....V         | <i>Hylobius excavatus</i> (LAICHTARTING, 1781).....R       |
| <i>Echinodera hypocrita</i> (BOHEMAN, 1837).....*            | <i>Hylobius pinastri</i> (GYLLENHAL, 1813).....D           |
| <i>Ellescus bipunctatus</i> (LINNAEUS, 1758).....*           | <i>Hylobius transversovittatus</i> (GOEZE, 1777).....V     |
| <i>Ellescus infirmus</i> (HERBST, 1795).....*                | <i>Hypera arator</i> (LINNAEUS, 1758).....*                |
| <i>Ellescus scanicus</i> (PAYKULL, 1792).....*               | <i>Hypera conmaculata</i> (HERBST, 1795).....V             |
| <i>Enedreytes sepicola</i> (FABRICIUS, 1792).....*           | <i>Hypera diversipunctata</i> (SCHRANK, 1798).....V        |
| <i>Epirhynchites auratus</i> (SCOPOLI, 1763).....*           | <i>Hypera melancholica</i> (FABRICIUS, 1793).....3         |
| <i>Eithelcus denticulatus</i> (SCHRANK, 1781).....0          | <i>Hypera meles</i> (FABRICIUS, 1792).....*                |
| <i>Eubrychius velutus</i> (BECK, 1817).....V                 | <i>Hypera miles</i> (PAYKULL, 1792).....*                  |
| <i>Eusomus ovulum</i> GERMAR, 1824.....*                     | <i>Hypera nigrirostris</i> (FABRICIUS, 1775).....*         |
| <i>Eutrichapion ervi</i> (W. KIRBY, 1808).....*              | <i>Hypera ononidis</i> (CHEVROLAT, 1863).....G             |
| <i>Eutrichapion facetum</i> (GYLLENHAL, 1839).....2          | <i>Hypera pastinacae</i> (ROSSI, 1790).....2               |
| <i>Eutrichapion melancholicum</i> (WENCKER, 1864).....2      | <i>Hypera plantaginis</i> (DEGEER, 1775).....*             |
| <i>Eutrichapion punctiger</i> (PAYKULL, 1792).....*          | <i>Hypera postica</i> (GYLLENHAL, 1813).....*              |
| <i>Eutrichapion viciae</i> (PAYKULL, 1800).....*             | <i>Hypera rumicis</i> (LINNAEUS, 1758).....*               |
| <i>Eutrichapion vorax</i> (HERBST, 1797).....*               | <i>Hypera striata</i> (BOHEMAN, 1834).....R                |
| <i>Exapion compactum</i> (DESBROCHERS, 1888).....G           | <i>Hypera venusta</i> (FABRICIUS, 1781).....*              |
| <i>Exapion corniculatum</i> (GERMAR, 1817).....2             | <i>Hypera viciae</i> (GYLLENHAL, 1813).....G               |
| <i>Exapion difficile</i> (HERBST, 1797).....*                | <i>Involvulus cupreus</i> (LINNAEUS, 1758).....*           |
| <i>Exapion elongatulum</i> (DESBROCHERS, 1891).....2         | <i>Ischnoptera pion loti</i> (W. KIRBY, 1808).....*        |
| <i>Exapion formaneki</i> (WAGNER, 1929).....V                | <i>Ischnoptera pion modestum</i> (GERMAR, 1817).....*      |
| <i>Exapion fuscirostre</i> (FABRICIUS, 1775).....*           | <i>Ischnoptera pion virens</i> (HERBST, 1797).....*        |
| <i>Exapion inexpertum</i> (WAGNER, 1906).....V               | <i>Isochnus angustifrons</i> (WEST, 1916).....G            |
| <i>Ferreria marqueti</i> (AUBÉ, 1863) [N].....◆              | <i>Isochnus foliorum</i> (MÜLLER, 1764).....G              |
| <i>Gasterocercus depressirostris</i> (FABRICIUS, 1792).....3 | <i>Isochnus sequensi</i> (STIERLIN, 1894).....*            |
| <i>Glocianus distinctus</i> (C. BRISOUT, 1870).....*         | <i>Ixapion variegatum</i> (WENCKER, 1864).....V            |
| <i>Glocianus moelleri</i> (C. G. THOMSON, 1868).....0        | <i>Kalcapion pallipes</i> (W. KIRBY, 1808).....*           |
| <i>Glocianus punctiger</i> (SAHLBERG, 1835).....*            | <i>Kalcapion semivittatum</i> (GYLLENHAL, 1833).....*      |
| <i>Gonotropis dorsalis</i> (THUNBERG, 1796).....G            | <i>Kyklioacalles aubei</i> (BOHEMAN, 1837).....*           |
| <i>Graptus triguttatus</i> (FABRICIUS, 1775).....*           | <i>Kyklioacalles navieresi</i> (BOHEMAN, 1837).....*       |
| <i>Gronops lunatus</i> (FABRICIUS, 1775).....3               | <i>Kyklioacalles roboris</i> (CURTIS, 1834).....*          |
| <i>Grypus brunnirostris</i> (FABRICIUS, 1792).....V          | <i>Larinus beckeri</i> PETRI, 1907.....D                   |
| <i>Grypus equiseti</i> (FABRICIUS, 1775).....*               | <i>Larinus jaceae</i> (FABRICIUS, 1775).....*              |
| <i>Gymnetron beccabungae</i> (LINNAEUS, 1761).....3          | <i>Larinus obtusus</i> GYLLENHAL, 1836.....2               |
| <i>Gymnetron melanarium</i> (GERMAR, 1821).....*             | <i>Larinus planus</i> (FABRICIUS, 1792).....*              |
| <i>Gymnetron rostellum</i> (HERBST, 1795).....G              | <i>Larinus pollinis</i> (LAICHTARTING, 1781).....2         |
| <i>Gymnetron stimulosum</i> (GERMAR, 1821).....3             | <i>Larinus sturnus</i> (SCHALLER, 1783).....*              |
| <i>Gymnetron veronicae</i> (GERMAR, 1821).....*              | <i>Larinus turbinatus</i> GYLLENHAL, 1835.....*            |
| <i>Gymnetron villosulum</i> GYLLENHAL, 1838.....*            | <i>Lasiiorhynchites cavifrons</i> (GYLLENHAL, 1833).....*  |
| <i>Hadroplontus litura</i> (FABRICIUS, 1775).....*           | <i>Leiosoma cribrum</i> (GYLLENHAL, 1834).....*            |

|  |  |
|--|--|
| <i>Leiosoma deflexum</i> (PANZER, 1795).....*          | <i>Mecinus labilis</i> (HERBST, 1795).....*                    |
| <i>Leiosoma oblongulum</i> BOHEMAN, 1842.....G         | <i>Mecinus pascuorum</i> (GYLLENHAL, 1813).....*               |
| <i>Lepyrus capucinus</i> (SCHALLER, 1783).....*        | <i>Mecinus plantaginis</i> (EPPELSEIM, 1875).....2             |
| <i>Lepyrus palustris</i> (SCOPOLI, 1763).....*         | <i>Mecinus pyraeter</i> (HERBST, 1795).....*                   |
| <i>Leucophyes occidentalis</i> (DIECKMANN, 1982).....2 | <i>Melanapion minimum</i> (HERBST, 1797).....*                 |
| <i>Lignyodes enucleator</i> (PANZER, 1798).....*       | <i>Miarus ajugae</i> (HERBST, 1795).....*                      |
| <i>Limnobaris dolorosa</i> (GOEZE, 1777).....*         | <i>Miarus campanulae</i> (LINNAEUS, 1767).....*                |
| <i>Limnobaris t-album</i> (LINNAEUS, 1758).....*       | <i>Miarus monticola</i> PETRI, 1912.....*                      |
| <i>Limobius borealis</i> (PAYKULL, 1792).....*         | <i>Micrelus ericae</i> (GYLLENHAL, 1813).....*                 |
| <i>Liophloeus tessulatus</i> (MÜLLER, 1776).....*      | <i>Microplontus campestris</i> (GYLLENHAL, 1837).....*         |
| <i>Liparus coronatus</i> (GOEZE, 1777).....*           | <i>Microplontus melanostigma</i> (MARSHAM, 1802).....*         |
| <i>Liparus dirus</i> (HERBST, 1795).....2              | <i>Microplontus millefolii</i> (SCHULTZE, 1897).....G          |
| <i>Liparus germanus</i> (LINNAEUS, 1758).....*         | <i>Microplontus rugulosus</i> (HERBST, 1795).....*             |
| <i>Liparus glabriorstris</i> KÜSTER, 1849.....*        | <i>Microplontus triangulum</i> (BOHEMAN, 1845).....G           |
| <i>Lixus angustus</i> (HERBST, 1795).....0             | <i>Minyops carinatus</i> (LINNAEUS, 1767).....0                |
| <i>Lixus bardanae</i> (FABRICIUS, 1787).....0          | <i>Mitoplithus caliginosus</i> (FABRICIUS, 1775).....*         |
| <i>Lixus fasciculatus</i> BOHEMAN, 1835.....V          | <i>Mogulones abbreviatulus</i> (FABRICIUS, 1792).....*         |
| <i>Lixus filiformis</i> (FABRICIUS, 1781).....*        | <i>Mogulones albosignatus</i> (GYLLENHAL, 1837).....0          |
| <i>Lixus iridis</i> OLIVIER, 1807.....2                | <i>Mogulones asperifoliarum</i> (GYLLENHAL, 1813).....*        |
| <i>Lixus linearis</i> OLIVIER, 1807.....1              | <i>Mogulones borraginis</i> (FABRICIUS, 1792).....0            |
| <i>Lixus myagri</i> OLIVIER, 1807.....0                | <i>Mogulones crucifer</i> (PALLAS, 1771).....3                 |
| <i>Lixus ochraceus</i> BOHEMAN, 1843.....1             | <i>Mogulones euphorbiae</i> (C. BRISOUT, 1866).....V           |
| <i>Lixus paraplecticus</i> (LINNAEUS, 1758).....0      | <i>Mogulones geographicus</i> (GOEZE, 1777).....*              |
| <i>Lixus pulverulentus</i> (SCOPOLI, 1763).....*       | <i>Mogulones larvatus</i> (SCHULTZE, 1897).....3               |
| <i>Lixus punctiventris</i> BOHEMAN, 1835.....2         | <i>Mogulones pallidicornis</i> (GOUG. & H. BRIS, 1860).....*   |
| <i>Lixus subtilis</i> BOHEMAN, 1835.....G              | <i>Mogulones raphani</i> (FABRICIUS, 1792).....*               |
| <i>Lixus vilis</i> (ROSSI, 1790).....0                 | <i>Mononychus punctumalbum</i> (HERBST, 1784).....*            |
| <i>Magdalis armigera</i> (GEOFFROY, 1785).....*        | <i>Nanomimus circumscriptus</i> (AUBÉ, 1864).....1             |
| <i>Magdalis barbicornis</i> (LATREILLE, 1804).....*    | <i>Nanophyes brevis</i> BOHEMAN, 1845.....*                    |
| <i>Magdalis carbonaria</i> (LINNAEUS, 1758).....V      | <i>Nanophyes globiformis</i> KIESENWETTER, 1864.....2          |
| <i>Magdalis cerasi</i> (LINNAEUS, 1758).....*          | <i>Nanophyes globulus</i> (GERMAR, 1821).....2                 |
| <i>Magdalis duplicata</i> GERMAR, 1819.....*           | <i>Nanophyes marmoratus</i> (GOEZE, 1777).....*                |
| <i>Magdalis exarata</i> (H. BRISOUT, 1862).....3       | <i>Nedyus quadrimaculatus</i> (LINNAEUS, 1758).....*           |
| <i>Magdalis flavicornis</i> (GYLLENHAL, 1836).....*    | <i>Nelasioryhynchites olivaceus</i> (GYLLENHAL, 1833).....*    |
| <i>Magdalis frontalis</i> (GYLLENHAL, 1827).....*      | <i>Nemonyx lepturoides</i> (FABRICIUS, 1801).....1             |
| <i>Magdalis fuscicornis</i> DESBROCHERS, 1870.....3    | <i>Neocoenorhinidius interpunctatus</i> (STEPHENS, 1831).....G |
| <i>Magdalis linearis</i> (GYLLENHAL, 1827).....*       | <i>Neocoenorhinidius pauxillus</i> (GERMAR, 1824).....*        |
| <i>Magdalis memnonia</i> (GYLLENHAL, 1837).....*       | <i>Neocoenorrhinus germanicus</i> (HERBST, 1797).....*         |
| <i>Magdalis nitida</i> (GYLLENHAL, 1827).....*         | <i>Neoglocianus maculaalba</i> (HERBST, 1795).....*            |
| <i>Magdalis nitidipennis</i> (BOHEMAN, 1843).....2     | <i>Neophytobius granatus</i> (GYLLENHAL, 1835).....3           |
| <i>Magdalis phlegmatica</i> (HERBST, 1797).....*       | <i>Neophytobius muricatus</i> (C. BRISOUT, 1867).....G         |
| <i>Magdalis punctulata</i> (MULS. & REY, 1859).....2   | <i>Neophytobius quadrinodosus</i> (GYLLENHAL, 1813).....G      |
| <i>Magdalis rufa</i> GERMAR, 1824.....*                | <i>Notaris acridula</i> (LINNAEUS, 1758).....*                 |
| <i>Magdalis ruficornis</i> (LINNAEUS, 1758).....*      | <i>Notaris scirpi</i> (FABRICIUS, 1792).....V                  |
| <i>Magdalis violacea</i> (LINNAEUS, 1758).....*        | <i>Omiamima mollina</i> (BOHEMAN, 1834).....0                  |
| <i>Malvapion malvae</i> (FABRICIUS, 1775).....*        | <i>Omius rotundatus</i> (FABRICIUS, 1792).....3                |
| <i>Marmaropus bessi</i> GYLLENHAL, 1837.....D          | <i>Omphalapion dispar</i> (GERMAR, 1817).....3                 |
| <i>Mecaspis alternans</i> (HERBST, 1795).....3         | <i>Omphalapion hookerorum</i> (W. KIRBY, 1808).....*           |
| <i>Mecinus collaris</i> GERMAR, 1821.....G             | <i>Omphalapion laevigatum</i> (PAYKULL, 1792).....2            |
| <i>Mecinus heydeni</i> WENCKER, 1866.....3             | <i>Onyxacalles pyrenaicus</i> (BOHEMAN, 1844).....*            |
| <i>Mecinus ictericus</i> (GYLLENHAL, 1838).....G       | <i>Opanthribus tessellatus</i> (BOHEMAN, 1829).....V           |
| <i>Mecinus janthinus</i> GERMAR, 1821.....*            | <i>Oprohinus consputus</i> (GERMAR, 1824).....3                |

|   |   |
|---|---|
| <i>Oprohinus suturalis</i> (FABRICIUS, 1775).....*          | <i>Oxystoma pomonae</i> (FABRICIUS, 1798).....*                       |
| <i>Orchestes alni</i> (LINNAEUS, 1758).....*                | <i>Oxystoma subulatum</i> (W. KIRBY, 1808).....*                      |
| <i>Orchestes avellanae</i> DONOVAN, 1797.....*              | <i>Pachycerus segnis</i> (GERMAR, 1824).....2                         |
| <i>Orchestes betuleti</i> (PANZER, 1795).....*              | <i>Pachyrhinus lethierryi</i> (DESBROCHERS, 1875) [N]...◆             |
| <i>Orchestes calceatus</i> (GERMAR, 1821).....G             | <i>Pachyrhinus mustela</i> HERBST, 1797.....*                         |
| <i>Orchestes erythropus</i> (GERMAR, 1821).....D            | <i>Pachytychius haematocephalus</i> (GYLLENHAL, 1835)..V              |
| <i>Orchestes fagi</i> (LINNAEUS, 1758).....*                | <i>Parafoucattia squamulata</i> (HERBST, 1795).....*                  |
| <i>Orchestes jota</i> (FABRICIUS, 1787).....2               | <i>Parethelcus pollinarius</i> (FORSTER, 1771).....*                  |
| <i>Orchestes pilosus</i> (FABRICIUS, 1781).....*            | <i>Pelenomus canaliculatus</i> (FÄHRAEUS, 1843).....3                 |
| <i>Orchestes quercus</i> (LINNAEUS, 1758).....*             | <i>Pelenomus commari</i> (PANZER, 1794).....*                         |
| <i>Orchestes rusci</i> (HERBST, 1795).....*                 | <i>Pelenomus quadricorniger</i> (COLONNELLI, 1986).....3              |
| <i>Orchestes testaceus</i> (O. F. MÜLLER, 1776).....*       | <i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (FABRICIUS, 1787)..V              |
| <i>Orobitis cyaneus</i> (LINNAEUS, 1758).....*              | <i>Pelenomus velaris</i> (GYLLENHAL, 1827).....0                      |
| <i>Orthochaetes setiger</i> (BECK, 1817).....V              | <i>Pelenomus waltoni</i> (BOHEMAN, 1843).....*                        |
| <i>Oryxolaemus flavifemoratus</i> (HERBST, 1797).....2      | <i>Perapion affine</i> (W. KIRBY, 1808).....*                         |
| <i>Otiiorhynchus armadillo</i> (ROSSI, 1792).....*          | <i>Perapion curtirostre</i> (GERMAR, 1817).....*                      |
| <i>Otiiorhynchus aurifer</i> BOHEMAN, 1843 [u].....◆        | <i>Perapion marchicum</i> (HERBST, 1797).....*                        |
| <i>Otiiorhynchus austriacus</i> (FABRICIUS, 1801) [N].....◆ | <i>Perapion violaceum</i> (W. KIRBY, 1808).....*                      |
| <i>Otiiorhynchus coecus</i> GERMAR, 1824.....*              | <i>Peritelus sphaeroides</i> GERMAR, 1824.....*                       |
| <i>Otiiorhynchus corruptor</i> (HOST, 1789) [u].....◆       | <i>Phaeochrotes pudens</i> (GYLLENHAL, 1833).....*                    |
| <i>Otiiorhynchus crataegi</i> GERMAR, 1824 [N].....◆        | <i>Philopeton plagiatum</i> (SCHALLER, 1783).....0                    |
| <i>Otiiorhynchus cribricollis</i> GYLLENHAL, 1834 [u].....◆ | <i>Phloeophagus lignarius</i> (MARSHAM, 1802).....*                   |
| <i>Otiiorhynchus desertus</i> ROSENHAUER, 1847.....G        | <i>Phloeophagus thomsoni</i> (GRILL, 1896).....D                      |
| <i>Otiiorhynchus dieckmanni</i> MAGNANO, 1979 [N].....◆     | <i>Phrissotrichum rugicolle</i> (GERMAR, 1817).....3                  |
| <i>Otiiorhynchus gemmatus</i> (SCOPOLI, 1763).....0         | <i>Phrydiuchus topiarius</i> (GERMAR, 1824).....3                     |
| <i>Otiiorhynchus geniculatus</i> GERMAR, 1817.....R         | <i>Phyllobius arborator</i> (HERBST, 1797).....*                      |
| <i>Otiiorhynchus lepidopterus</i> (FABRICIUS, 1794).....R   | <i>Phyllobius argentatus</i> (LINNAEUS, 1758).....*                   |
| <i>Otiiorhynchus ligneus</i> (OLIVIER, 1807).....1          | <i>Phyllobius betulinus</i><br>(BECHSTEIN & SCHARFENBERG, 1805).....* |
| <i>Otiiorhynchus ligustici</i> (LINNAEUS, 1758).....*       | <i>Phyllobius glaucus</i> (SCOPOLI, 1763).....*                       |
| <i>Otiiorhynchus meridionalis</i> GYLLENHAL, 1834 [N].....◆ | <i>Phyllobius maculicornis</i> GERMAR, 1824.....*                     |
| <i>Otiiorhynchus morio</i> (FABRICIUS, 1781).....*          | <i>Phyllobius oblongus</i> (LINNAEUS, 1758).....*                     |
| <i>Otiiorhynchus nodosus</i> (MÜLLER, 1764).....*           | <i>Phyllobius pomaceus</i> GYLLENHAL, 1834.....*                      |
| <i>Otiiorhynchus ovatus</i> (LINNAEUS, 1758).....*          | <i>Phyllobius pyri</i> (LINNAEUS, 1758).....*                         |
| <i>Otiiorhynchus pinastri</i> (HERBST, 1795).....*          | <i>Phyllobius subdentatus</i> (BOHEMAN, 1843).....*                   |
| <i>Otiiorhynchus porcatus</i> (HERBST, 1795).....*          | <i>Phyllobius vespertinus</i> (FABRICIUS, 1792).....*                 |
| <i>Otiiorhynchus raucus</i> (FABRICIUS, 1777).....*         | <i>Phyllobius virideaeris</i> (LAICHTARTING, 1781).....*              |
| <i>Otiiorhynchus rugifrons</i> (GYLLENHAL, 1813).....V      | <i>Phyllobius viridicollis</i> (FABRICIUS, 1792).....*                |
| <i>Otiiorhynchus rugosostriatus</i> (GOEZE, 1777).....*     | <i>Phytobius leucogaster</i> (MARSHAM, 1802).....V                    |
| <i>Otiiorhynchus salicicola</i> HEYDEN, 1908 [N].....◆      | <i>Pirapion atratum</i> (GERMAR, 1817).....V                          |
| <i>Otiiorhynchus scaber</i> (LINNAEUS, 1758).....*          | <i>Pirapion immune</i> (W. KIRBY, 1808).....V                         |
| <i>Otiiorhynchus singularis</i> (LINNAEUS, 1767).....*      | <i>Pissodes castaneus</i> (DEGEER, 1775).....*                        |
| <i>Otiiorhynchus smreczynskii</i> CMOLUCH, 1968 [N].....◆   | <i>Pissodes harcyniae</i> (HERBST, 1795).....*                        |
| <i>Otiiorhynchus squamosus</i> MILLER, 1859.....R           | <i>Pissodes piceae</i> (ILLIGER, 1807).....*                          |
| <i>Otiiorhynchus subdentatus</i> BACH, 1854.....*           | <i>Pissodes pini</i> (LINNAEUS, 1758).....*                           |
| <i>Otiiorhynchus sulcatus</i> (FABRICIUS, 1775).....*       | <i>Pissodes piniphilus</i> (HERBST, 1797).....*                       |
| <i>Otiiorhynchus tenebricosus</i> (HERBST, 1784).....*      | <i>Pissodes scabricollis</i> MILLER, 1859.....R                       |
| <i>Otiiorhynchus uncinatus</i> GERMAR, 1824.....V           | <i>Pissodes validirostris</i> (SAHLBERG, 1834).....3                  |
| <i>Otiiorhynchus veterator</i> UYTENBOOGAART, 1932.....*    | <i>Platyrhinus resinosis</i> (SCOPOLI, 1763).....*                    |
| <i>Oxystoma cerdo</i> (GERSTAECKER, 1854).....*             | <i>Platystomos albinus</i> (LINNAEUS, 1758).....*                     |
| <i>Oxystoma cracca</i> (LINNAEUS, 1767).....*               | <i>Plinthus findeli</i> BOHEMAN, 1842.....*                           |
| <i>Oxystoma ochropus</i> (GERMAR, 1818).....*               | <i>Polydrusus aeratus</i> GRAVENHORST, 1807.....*                     |
| <i>Oxystoma opeticum</i> (BACH, 1854).....3                 |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Polydrusus amoenus</i> (GERMAR, 1824).....             | 0 | <i>Rhinoncus albicinctus</i> GYLLENHAL, 1837 .....        | 3 |
| <i>Polydrusus cervinus</i> (LINNAEUS, 1758).....          | * | <i>Rhinoncus bruchoides</i> (HERBST, 1784).....           | * |
| <i>Polydrusus confluens</i> STEPHENS, 1831.....           | * | <i>Rhinoncus castor</i> (FABRICIUS, 1792).....            | * |
| <i>Polydrusus corruscus</i> GERMAR, 1824.....             | V | <i>Rhinoncus henningsi</i> WAGNER, 1936.....              | * |
| <i>Polydrusus flavipes</i> (DEGEER, 1775).....            | 2 | <i>Rhinoncus inconspicuum</i> (HERBST, 1795).....         | * |
| <i>Polydrusus formosus</i> (MAYER, 1779).....             | * | <i>Rhinoncus pericarpus</i> (LINNAEUS, 1758).....         | * |
| <i>Polydrusus impar</i> GOZIS, 1882.....                  | * | <i>Rhinoncus perpendicularis</i> (REICH, 1797) .....      | * |
| <i>Polydrusus impressifrons</i> GYLLENHAL, 1834 .....     | * | <i>Rhinusa antirrhini</i> (PAYKULL, 1800).....            | * |
| <i>Polydrusus inustus</i> GERMAR, 1824 [N].....           | ◆ | <i>Rhinusa asellus</i> (GRAVENHORST, 1807) .....          | * |
| <i>Polydrusus marginatus</i> STEPHENS, 1831.....          | * | <i>Rhinusa bipustulata</i> (ROSSI, 1792).....             | * |
| <i>Polydrusus mollis</i> (STRÖM, 1768).....               | * | <i>Rhinusa collina</i> (GYLLENHAL, 1813).....             | G |
| <i>Polydrusus pilosus</i> GREDLER, 1866 .....             | * | <i>Rhinusa eversmanni</i> (ROSENSCHÖLD, 1838).....        | 1 |
| <i>Polydrusus prasinus</i> (OLIVIER, 1790).....           | G | <i>Rhinusa herbarum</i> (H. BRISOUT, 1862) .....          | G |
| <i>Polydrusus pterygomalis</i> BOHEMAN, 1840.....         | * | <i>Rhinusa linariae</i> (PANZER, 1792).....               | * |
| <i>Polydrusus tereticollis</i> (DEGEER, 1775).....        | * | <i>Rhinusa melas</i> (BOHEMAN, 1838) .....                | G |
| <i>Poophagus sisymbrii</i> (FABRICIUS, 1776).....         | V | <i>Rhinusa neta</i> (GERMAR, 1821).....                   | V |
| <i>Protapion apricans</i> (HERBST, 1797).....             | * | <i>Rhinusa pilosa</i> (GYLLENHAL, 1838) .....             | 0 |
| <i>Protapion assimile</i> (W. KIRBY, 1808).....           | * | <i>Rhinusa tetra</i> (FABRICIUS, 1792).....               | * |
| <i>Protapion difforme</i> (GERMAR, 1818) .....            | 0 | <i>Rhopalapion longirostre</i> (OLIVIER, 1807) [N].....   | ◆ |
| <i>Protapion dissimile</i> (GERMAR, 1817).....            | 3 | <i>Rhynchaenus xylostei</i> CLAIRVILLE, 1798.....         | V |
| <i>Protapion filirostre</i> (W. KIRBY, 1808).....         | * | <i>Rhynchites bacchus</i> (LINNAEUS, 1758) .....          | 3 |
| <i>Protapion fulvipes</i> (GEOFFROY, 1785).....           | * | <i>Rhyncolus ater</i> (LINNAEUS, 1758).....               | * |
| <i>Protapion gracilipes</i> (DIETRICH, 1857).....         | * | <i>Rhyncolus elongatus</i> (GYLLENHAL, 1827).....         | 3 |
| <i>Protapion interjectum</i> (DESBROCHERS, 1895).....     | 3 | <i>Rhyncolus punctatulus</i> BOHEMAN, 1838 .....          | * |
| <i>Protapion nigritarse</i> (W. KIRBY, 1808) .....        | * | <i>Rhyncolus reflexus</i> BOHEMAN, 1838 .....             | 3 |
| <i>Protapion ononidis</i> (GYLLENHAL, 1827) .....         | 2 | <i>Rhyncolus sculpturatus</i> WALTZ, 1839 .....           | 2 |
| <i>Protapion ruficus</i> (GERMAR, 1817) .....             | 3 | <i>Rutidosoma globulus</i> (HERBST, 1795) .....           | * |
| <i>Protapion trifolii</i> (LINNAEUS, 1768).....           | * | <i>Schoenitemnus minutus</i> (HERBST, 1797).....          | * |
| <i>Protapion varipes</i> (GERMAR, 1817) .....             | 3 | <i>Sciaphilus asperatus</i> (BONSDORFF, 1785) .....       | * |
| <i>Pseudapion moschatae</i> (HOFFMANN, 1938) .....        | 3 | <i>Sciaphobus scitulus</i> (GERMAR, 1824) .....           | 0 |
| <i>Pseudapion rufirostre</i> (FABRICIUS, 1775).....       | * | <i>Scleropteridius fallax</i> (OTTO, 1897).....           | * |
| <i>Pseudocleonus cinereus</i> (SCHRANK, 1781).....        | 2 | <i>Scleropterus serratus</i> (GERMAR, 1824).....          | 1 |
| <i>Pseudocleonus grammicus</i> (PANZER, 1789).....        | 2 | <i>Sibinia pellucens</i> (SCOPOLI, 1772) .....            | * |
| <i>Pseudomechoris aethiops</i> (BACH, 1854) .....         | 3 | <i>Sibinia phalerata</i> (GYLLENHAL, 1836) .....          | 3 |
| <i>Pseudomylloceris sinuatus</i> (FABRICIUS, 1801).....   | 3 | <i>Sibinia primita</i> (HERBST, 1795).....                | 2 |
| <i>Pseudoperapion brevirostre</i> (HERBST, 1797).....     | * | <i>Sibinia pyrrhodactyla</i> (MARSHAM, 1802) .....        | V |
| <i>Pseudoprotapion astragali</i> (PAYKULL, 1800).....     | * | <i>Sibinia subelliptica</i> (DESBROCHERS, 1873).....      | 3 |
| <i>Pseudoprotapion elegantulum</i> (GERMAR, 1818).....    | V | <i>Sibinia tibialis</i> GYLLENHAL, 1836 .....             | 1 |
| <i>Pseudorcheses ermischii</i> (DIECKMANN, 1958) .....    | V | <i>Sibinia variata</i> (GYLLENHAL, 1835).....             | 3 |
| <i>Pseudorcheses pratensis</i> (GERMAR, 1821).....        | G | <i>Sibinia viscaria</i> (LINNAEUS, 1761).....             | * |
| <i>Pseudorcheses purkynei</i> (DIECKMANN, 1958) .....     | 1 | <i>Simo hirticornis</i> (HERBST, 1795) .....              | * |
| <i>Pseudostenapion simum</i> (GERMAR, 1817) .....         | * | <i>Simo variegatus</i> (BOHEMAN, 1843).....               | * |
| <i>Pseudostyphlus pillumus</i> (GYLLENHAL, 1835) .....    | G | <i>Sirocalodes depressicollis</i> (GYLLENHAL, 1813) ..... | * |
| <i>Ranunculiphilus lycoctoni</i> (HUSTACHE, 1917) .....   | 0 | <i>Sirocalodes quercicola</i> (PAYKULL, 1792).....        | 3 |
| <i>Rhabdorrhynchus seriegranosus</i> CHEVOLAT, 1873 ..... | 1 | <i>Sitona ambiguus</i> GYLLENHAL, 1834.....               | * |
| <i>Rhamphus oxyacanthae</i> (MARSHAM, 1802) .....         | D | <i>Sitona cambricus</i> STEPHENS, 1831 .....              | V |
| <i>Rhamphus pulicarius</i> (HERBST, 1795).....            | * | <i>Sitona cylindricollis</i> FAHRAEUS, 1840.....          | * |
| <i>Rhamphus subaeneus</i> ILLIGER, 1807.....              | V | <i>Sitona gressorius</i> (FABRICIUS, 1792).....           | * |
| <i>Rhaphitropis marchica</i> (HERBST, 1797).....          | * | <i>Sitona griseus</i> (FABRICIUS, 1775).....              | V |
| <i>Rhaphitropis oxyacanthae</i> (C. BRISOUT, 1863) .....  | R | <i>Sitona hispidulus</i> (FABRICIUS, 1777).....           | * |
| <i>Rhinocyllus conicus</i> (FRÖLICH, 1792).....           | * | <i>Sitona humeralis</i> STEPHENS, 1831 .....              | * |
| <i>Rhinomias forticornis</i> (BOHEMAN, 1843).....         | 3 | <i>Sitona inops</i> GYLLENHAL, 1832.....                  | * |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <i>Sitona intermedius</i> KÜSTER, 1847.....                   | 2 | <i>Tanysphyrus lemnae</i> (PAYKULL, 1792).....             | * |
| <i>Sitona languidus</i> GYLLENHAL, 1834.....                  | * | <i>Tapeinotus sellatus</i> (FABRICIUS, 1794).....          | * |
| <i>Sitona lateralis</i> GYLLENHAL, 1834.....                  | V | <i>Taphrotopium sulcifrons</i> (HERBST, 1797).....         | 1 |
| <i>Sitona lepidus</i> GYLLENHAL, 1834.....                    | * | <i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (LINNAEUS, 1767).....   | * |
| <i>Sitona lineatus</i> (LINNAEUS, 1758).....                  | * | <i>Temnocerus longiceps</i> (THOMSON, 1888).....           | * |
| <i>Sitona macularius</i> (MARSHAM, 1802).....                 | * | <i>Temnocerus nanus</i> (PAYKULL, 1792).....               | * |
| <i>Sitona puncticollis</i> STEPHENS, 1831.....                | * | <i>Temnocerus tomentosus</i> (GYLLENHAL, 1839).....        | * |
| <i>Sitona regensteiniensis</i> (HERBST, 1797).....            | * | <i>Teretriorhynchites caeruleus</i> (DEGEER, 1775).....    | * |
| <i>Sitona striatellus</i> GYLLENHAL, 1834.....                | * | <i>Teretriorhynchites pubescens</i> (FABRICIUS, 1775)..... | D |
| <i>Sitona sulcifrons</i> (THUNBERG, 1798).....                | * | <i>Thamiocolus pubicollis</i> (GYLLENHAL, 1837).....       | 1 |
| <i>Sitona suturalis</i> STEPHENS, 1831.....                   | * | <i>Thamiocolus signatus</i> (GYLLENHAL, 1837).....         | 3 |
| <i>Sitona waterhousei</i> WALTON, 1846.....                   | V | <i>Thamiocolus viduatus</i> (GYLLENHAL, 1813).....         | * |
| <i>Sitophilus granarius</i> (FABRICIUS, 1758).....            | * | <i>Thryogenes festucae</i> (HERBST, 1795).....             | 3 |
| <i>Sitophilus linearis</i> (HERBST, 1797) [u].....            | ◆ | <i>Thryogenes nereis</i> (PAYKULL, 1800).....              | 3 |
| <i>Sitophilus oryzae</i> (LINNAEUS, 1763) [N].....            | ◆ | <i>Thryogenes scirrhosus</i> (GYLLENHAL, 1836).....        | G |
| <i>Sitophilus zeamais</i> MOTSCHULSKY, 1855 [N].....          | ◆ | <i>Tournotaris bimaculata</i> (FABRICIUS, 1787).....       | 3 |
| <i>Smicronyx coecus</i> (REICH, 1797).....                    | 2 | <i>Trachodes hispidus</i> (LINNAEUS, 1758).....            | * |
| <i>Smicronyx jungermanniae</i> (REICH, 1797).....             | V | <i>Trachyphloeus alternans</i> GYLLENHAL, 1834.....        | * |
| <i>Smicronyx nebulosus</i> TOURNIER, 1874.....                | G | <i>Trachyphloeus angustisetulus</i> HANSEN, 1915.....      | * |
| <i>Smicronyx reichii</i> (GYLLENHAL, 1835).....               | 2 | <i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (BECK, 1817).....        | * |
| <i>Smicronyx smreczynskii</i> SOLARI, 1952.....               | D | <i>Trachyphloeus rectus</i> C. G. THOMSON, 1865.....       | 0 |
| <i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (GOEZE, 1777).....       | * | <i>Trachyphloeus scabriculus</i> (LINNAEUS, 1771).....     | * |
| <i>Squamapion atomarium</i> (W. KIRBY, 1808).....             | * | <i>Trachyphloeus spinimanus</i> GERMAR, 1824.....          | V |
| <i>Squamapion cineraceum</i> (WENCKER, 1864).....             | * | <i>Trichopterapion holosericeum</i> (GYLLENHAL, 1833)..... | R |
| <i>Squamapion elongatum</i> (GERMAR, 1817).....               | V | <i>Trichosirocalus barnevillei</i> (GRENIER, 1866).....    | 3 |
| <i>Squamapion flavimanum</i> (GYLLENHAL, 1833).....           | * | <i>Trichosirocalus horridus</i> (PANZER, 1801).....        | 3 |
| <i>Squamapion hoffmanni</i> (WAGNER, 1930).....               | 3 | <i>Trichosirocalus spurnyi</i> (SCHULTZE, 1901).....       | 1 |
| <i>Squamapion oblivium</i> (SCHILSKY, 1902).....              | 3 | <i>Trichosirocalus troglodytes</i> (FABRICIUS, 1787).....  | * |
| <i>Squamapion origani</i> (PLANET, 1918).....                 | 3 | <i>Tropideres albirostris</i> (SCHALLER, 1783).....        | * |
| <i>Squamapion vicinum</i> (W. KIRBY, 1808).....               | 2 | <i>Tropiphorus cucullatus</i> FAUVEL, 1888.....            | 2 |
| <i>Stasioidis parvulus</i> (FABRICIUS, 1792).....             | 2 | <i>Tropiphorus elevatus</i> (HERBST, 1795).....            | * |
| <i>Stenocarus cardui</i> (HERBST, 1784).....                  | 0 | <i>Tropiphorus terricola</i> (NEWMAN, 1838).....           | 0 |
| <i>Stenocarus ruficornis</i> (STEPHENS, 1831).....            | * | <i>Tychius aureolus</i> KIESENWETTER, 1851.....            | * |
| <i>Stenopelmus rufinasus</i> GYLLENHAL, 1835.....             | * | <i>Tychius breviusculus</i> DESBROCHERS, 1873.....         | * |
| <i>Stenopterapion intermedium</i> (EPPELSHEIM, 1875).....     | 3 | <i>Tychius crassirostris</i> KIRSCH, 1871.....             | 3 |
| <i>Stenopterapion meliloti</i> (W. KIRBY, 1808).....          | * | <i>Tychius cuprifer</i> (PANZER, 1799).....                | V |
| <i>Stenopterapion tenue</i> (W. KIRBY, 1808).....             | * | <i>Tychius junceus</i> (REICH, 1797).....                  | * |
| <i>Stenorhynchites coeruleocephalus</i> (SCHALLER, 1783)..... | V | <i>Tychius lineatulus</i> STEPHENS, 1831.....              | V |
| <i>Stereocorynes truncorum</i> (GERMAR, 1824).....            | * | <i>Tychius medicaginis</i> C. BRISOUT, 1862.....           | * |
| <i>Stereonychus fraxini</i> (DEGEER, 1775).....               | * | <i>Tychius meliloti</i> STEPHENS, 1831.....                | * |
| <i>Strophosoma capitatum</i> (DEGEER, 1775).....              | * | <i>Tychius parallelus</i> (PANZER, 1794).....              | * |
| <i>Strophosoma faber</i> (HERBST, 1785).....                  | V | <i>Tychius picirostris</i> (FABRICIUS, 1787).....          | * |
| <i>Strophosoma melanogrammum</i> (FORSTER, 1771).....         | * | <i>Tychius polylineatus</i> (GERMAR, 1824).....            | 2 |
| <i>Synapion ebeninum</i> (W. KIRBY, 1808).....                | * | <i>Tychius pumilus</i> C. BRISOUT, 1862.....               | V |
| <i>Tachyerges decoratus</i> (GERMAR, 1821).....               | * | <i>Tychius pusillus</i> GERMAR, 1842.....                  | V |
| <i>Tachyerges pseudostigma</i> (TEMPÈRE, 1982).....           | * | <i>Tychius quinquepunctatus</i> (LINNAEUS, 1758).....      | * |
| <i>Tachyerges rufitarsis</i> (GERMAR, 1821).....              | G | <i>Tychius schneideri</i> (HERBST, 1795).....              | V |
| <i>Tachyerges salicis</i> (LINNAEUS, 1758).....               | * | <i>Tychius sharpi</i> TOURNIER, 1873.....                  | 2 |
| <i>Tachyerges stigma</i> (GERMAR, 1821).....                  | * | <i>Tychius squamulatus</i> GYLLENHAL, 1836.....            | D |
| <i>Taeniapion urticarium</i> (HERBST, 1784).....              | * | <i>Tychius stephensi</i> SCHÖNHERR, 1836.....              | * |
| <i>Tanymecus palliatus</i> (FABRICIUS, 1787).....             | * | <i>Zacladus exiguus</i> (OLIVIER, 1807).....               | * |
| <i>Tanysphyrus ater</i> BLATCHLEY, 1928.....                  | 2 | <i>Zacladus geranii</i> (PAYKULL, 1800).....               | * |