


## Aufrechter Ziest (*Stachys recta*)



© S. Demuth

Das Verbreitungsbild des Aufrechten Ziests zeigt sehr gut die Verbreitung der Kalkgebiete in Baden-Württemberg mit Vorkommen von Trocken- und Halbtrockenrasen. In den Naturräumen mit überwiegend bodensauren Standorten wie Schwarzwald, Odenwald, Schwäbisch-Fränkischer Wald und Donau-Iller-Lech-Platten fehlt die Art weitgehend.



Rote Liste Baden-Württemberg:

nicht gefährdet

Rote Liste Deutschland:

nicht gefährdet

Erfassung der Wuchsorte

durch die Biotopkartierung:

weitgehend vollständig

Fragliche Nachweise:

Punkte im Schwarzwald

Nachweise je 100 km<sup>2</sup> in den Naturräumen:

3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22
10,5	2,54	75,2	4,15	0,62	31,1	51,1	2,39	(0,52)	18,3	48,3	6,17	3,16

Quelle: Offenland- und Waldbiotopkartierung 1992-2004

- |    |                                |    |                               |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 3  | Voralpines Hügel- und Moorland | 14 | Odenwald                      |
| 4  | Donau-Iller-Lech-Platte        | 15 | Schwarzwald                   |
| 9  | Schwäbische Alb                | 16 | Hochrheingebiet               |
| 10 | Schwäbisches Keuper-Lias-Land  | 20 | Südliches Oberrhein-Tiefland  |
| 11 | Fränkisches Keuper-Lias-Land   | 21 | Mittleres Oberrhein-Tiefland  |
| 12 | Neckar- und Tauber-Gäuplatten  | 22 | Nördliches Oberrhein-Tiefland |
| 13 | Mainfränkische Platten         |    |                               |