

Bach-Kratzdistel (*Cirsium rivulare*)




© S. Demuth

Die Bach-Kratzdistel ist kennzeichnend für Nasswiesen und Pfeifengras-Streuwiesen auf sickerfeuchten, basenreichen Standorten. Sie ist wie in Bayern fast nur in der südlichen Landeshälfte anzutreffen. Ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen am Südostrand des Schwarzwaldes, in der Baar und im Alpenvorland, hier vor allem in den Moorebenen des Westallgäuer Hügellandes. Im Südlichen Oberrhein-Tiefland sind die Vorkommen auf die Freiburger Bucht beschränkt.

Rote Liste Baden-Württemberg: Vorwarnstufe
 Rote Liste Deutschland: nicht gefährdet
 Erfassung der Wuchsorte durch die Biotopkartierung: weitgehend vollständig
 Fragliche Nachweise: Punkte im nördlichen Landesteil

Nachweise je 100 km² in den Naturräumen:

3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22
32,4	13,9	5,07	3,02	-	4,44	-	(0,1)	8,14	-	1,77	-	-



Quelle: Offenland- und Waldbiotopkartierung 1992-2004

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 3 | Voralpines Hügel- und Moorland | 14 | Odenwald |
| 4 | Donau-Iller-Lech-Platte | 15 | Schwarzwald |
| 9 | Schwäbische Alb | 16 | Hochrheingebiet |
| 10 | Schwäbisches Keuper-Lias-Land | 20 | Südliches Oberrhein-Tiefland |
| 11 | Fränkisches Keuper-Lias-Land | 21 | Mittleres Oberrhein-Tiefland |
| 12 | Neckar- und Tauber-Gäuplatten | 22 | Nördliches Oberrhein-Tiefland |
| 13 | Mainfränkische Platten | | |